

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE

ABONNEMENT ANNUEL : ~~XXXLX~~

ET FRANCHE-COMTÉ - COTE-D'OR - SAONE-ET-LOIRE - YONNE - NIÈVRE - JURA - DOUBS - HAUTE-SAONE - TERRITOIRE DE BELFORT 60 F.

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CEDEX - Tél. (80) 22.19.38

Régisseur de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C. C. P. DIJON 3405.12 K

Bulletin n° 131 - 23 juin 1978

## V I G N E

MILDIOU : Des repiquages et même des contaminations primaires (toujours possibles) ont pu avoir lieu au cours de la dernière période pluvieuse totalisant localement 25 à 40 mm d'eau et nécessitant de renouveler la couverture fongicide précédente.

Un nouveau traitement est recommandé du 29 juin au 2 juillet visant à protéger tout particulièrement les grappes, soit à la chute des capuchons floraux en secteurs précoces, soit en début floraison pour les situations tardives (Hautes-Côtes).

OÏDIUM : Après floraison 3 Kg de soufre/hectare suffisent.

POURRITURE GRISE : Se reporter au bulletin n° 130 du 15 juin pour les modalités d'application du premier traitement anti-botrytis.

## POMME DE TERRE

MILDIOU : Bien que la maladie n'ait pas encore été signalée, il est recommandé d'exécuter un premier traitement préventif dès le début de la semaine prochaine, l'ensemble des cultures étant proche ou ayant atteint la floraison.

DORYPHORES : Si nécessaire ajouter un insecticide contre les larves de doryphores.

## CULTURES LÉGUMIÈRES

TEIGNE DU POIREAU : Des captures de papillons sont observées dans les pièges sexuels depuis le 10 juin et des éclosions de larves peuvent avoir lieu ces jours-ci. En conséquence dans les zones infestées un traitement peut être préconisé en début de semaine prochaine.

On peut utiliser de nombreux insecticides tels que : méthidathion à 30 g. de matière active/hl (Ultracide), chlorfenvinphos à 40 g. de m.a./hl (Birlane), parathion méthyl à 40 g. de m.a./hl (nombreuses spécialités) etc... ; il est indispensable de bien mouiller.

MILDIOU DE L'OIGNON : En raison des risques actuels maintenir la couverture fongicide.

SEPTORIOSE DU CELERI : La dernière période humide ayant favorisé des repiquages (premières taches déjà observées en cultures), une application fongicide est conseillée les tout derniers jours de juin.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie,  
Chef de la Circonscription phytosanitaire  
"Bourgogne et Franche-Comté"

G. VARLET

RECTIFICATIF : Le dernier bulletin du 15 juin devait recevoir le numéro 130 (et non 129)

Inscription à la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse n°527AD.